

Số: /TB - TTDVTH

Kiều Phú, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
hại lúa vụ Xuân 2026

Hiện nay, trên địa bàn xã Kiều Phú lúa sớm đang ở giai đoạn trổ bông – chín sữa, lúa trà chính vụ giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng, cây lúa sinh trưởng bình thường. Sâu bệnh phát sinh và gây hại trên lúa như: Chuột, ruồi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm, bọ rầy, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bạc lá... gây hại.

Để kịp thời trong việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, cụ thể như sau:

1. Bón phân

- Đối với lúa trà chính vụ có thời gian gieo cấy sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà con kiểm tra đồng ruộng nếu thấy danh cái lúa thất eo đầu lá, thân tròn, bên trong thân có lông (nhú bông), tập trung bón thúc đòng, lượng bón cho 1 sào bắc bộ từ 7 - 8kg NPK (loại phân thúc đòng) hoặc 4 - 4,5kg Kaliclorua (nếu lá lúa vàng, thiếu dinh dưỡng thì bón thêm 1 - 1,5kg Đạm Urê), luôn giữ mực nước trong ruộng từ 3 - 5 cm, giúp lúa phát triển đòng thuận lợi.

Lưu ý: Bà con chỉ bón bổ sung đạm khi thấy lá lúa có biểu hiện màu vàng (thiếu dinh dưỡng).

2. Phòng trừ sâu bệnh

Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra ruộng lúa, phát hiện sớm đối tượng sâu bệnh hại và chủ động phòng trừ như sau:

- *Đối với bệnh đạo ôn:* Tổ chức phun phòng trừ bệnh đạo ôn ở những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh hại lá $\geq 5\%$ số lá bị bệnh hoặc $\geq 1\%$ số lá đòng, cổ lá áp đòng bị bệnh bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu có chứa hoạt chất *Isoprothiolane, Tricyclazole, Propiconazole*,... như Filia 525SE, Beam® 75WP, Bump Gold 40WP,... dùng bón đạm ở những diện tích lúa đã bị bệnh, những diện tích bị bệnh nặng cần vơ bỏ lá bệnh đem tiêu hủy trước khi phun và tiến hành phun kép lần 2 cách lần 1 từ 3 - 5 ngày. Đối với những diện tích lúa đã bị bệnh đạo ôn gây hại trên lá, khi lúa trổ sắp soi (trổ khoảng 5 – 10% diện tích) cần phun phòng đạo ôn cổ bông gây hại và phun nhắc lại khi lúa trổ thoát hết,

đặc biệt khi lúa trở gặp thời tiết trời âm u, sương mù hoặc có mưa nhỏ, mưa rào là điều kiện rất thuận lợi để bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, lây lan và gây hại diện rộng

- *Đối với bệnh khô vằn, đen lép hạt*: khi ruộng bị bệnh > 10% dảnh (Bệnh khô vằn) và 5% hạt (Bệnh đen lép hạt) sử dụng thuốc có hoạt chất *Azoxystrobin, Hexaconazole, Difenoconazole* như: Help 400SC, Anvil® 5SC, Tungvil 5SC, Tilt Super® 300EC,...những diện tích lúa trở gặp mưa bà con cần chủ động phun phòng bệnh đen lép hạt trước hoặc sau khi mưa kết thúc.

- *Đối với bọ rầy*: Những diện tích lúa có mật độ bọ rầy > 30 con/khóm cần tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất *Abamectin, Nitenpyram, Pymetrozine, Thiamethoxam* như: Nouvo 3.6EC, Shertin 5.0EC, Virtako 40WG, Actara 25WP,...

- *Đối với sâu đục thân 2 chấm*: Sử dụng thuốc phòng trừ sâu đục thân 2 chấm trên những diện tích lúa trở sắp soi (lúa trở 5 - 10% diện tích) khi diện tích lúa có tỷ lệ hại > 5% dảnh hoặc mật độ ổ trứng > 0,3 ổ trứng/m² bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất *Chlorantraniliprole, Emamectin* như: Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Tasieu 5WG,...

Chú ý: phun đủ 25 - 30 lít nước thuốc đã pha/sào, phun vào sáng sớm (khi ráo sương) hoặc chiều mát; Thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ đúng nơi quy định./.

Nơi nhận:

- UBND xã Kiều Phú; (bc)
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm DVTH; (để tuyên truyền)
- Các HTX NN trên địa bàn xã Kiều Phú;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Kiều Minh Khuê